

## PLURYAL MESOLINE ANTIOX

1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 φιαλίδια των 5ml

### 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

<b>ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ</b>	<p>ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ: Θεραπεία του προσβεβλημένου δέρματος (μετά την έκθεση στον ήλιο, την απώλεια βάρους ή τη μη ισορροπημένη διατροφή, ασθένειες, στρες κλπ.)</p> <p>ΜΑΛΛΙΑ: Θεραπεία της διάχυτης/τελογενούς αλωπεκίας (απώλεια μαλλιών), σε άνδρες και γυναίκες</p>
<b>ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ασθενείς που κάνουν συχνά ηλιοθεραπεία</li><li>- Ασθενείς υπό αυστηρή διατροφή, που παρακολουθούν το βάρος τους</li><li>- Ασθενείς με άγχος (συχνές μετακινήσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, ασθένειες κ.λπ.).</li><li>- Ασθενείς που παρουσιάζουν τριχόπτωση ή αραιώση μαλλιών εξαιτίας της διάχυτης (τελογενούς) αλωπεκίας</li></ul>
<b>ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	Πρόσωπο, λαιμός, ντεκολτέ, τριχωτό κεφαλής
<b>ΣΥΝΘΕΣΗ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Αντιοξειδωτικά (γλουταθειόνη, μαννιτόλη, άλφα λιποϊκό οξύ)</li><li>- Μεταλλικά στοιχεία: ψευδάργυρος</li><li>- Αμινοξέα: κυστεΐνη, προλίνη, ταυρίνη και κυστίνη</li></ul>

### 3. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

<b>ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Απολυμάνετε σχολαστικά την υπό θεραπεία περιοχή με χλωρεξιδίνη.</li><li>- Συνταγογραφήστε αντική θεραπεία σε περιπτώσεις κινδύνου έρπητα.-Μην εφαρμόζετε σε ασθενείς που πάσχουν από έρπητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.</li><li>- Απαγορεύστε την ασπιρίνη ή άλλα αντιπηκτικά τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη συνεδρία</li><li>- Είναι δυνατή η τοπική αναισθησία με μια τοπική αναισθητική κρέμα. Μπορείτε επιπρόσθετα να προσθέσετε 0,2 ml λιδοκαΐνης στο φιαλίδιο του Pluryal mesoline ANTIOX.</li></ul>
<b>ΜΕΤΑ ΤΗ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 72 ώρες μετά τη θεραπεία.</li><li>- Στη συνέχεια, η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη (καθημερινά) και μια αντιηλιακή κρέμα με δείκτη προστασίας SPF 50+ θα πρέπει να</li></ul>

<b>ΘΕΡΑΠΕΙΑ</b>	εφαρμόζεται καθημερινά και να επαναλαμβάνεται κάθε 2 ώρες σε περίπτωση έντονης έκθεσης στον ήλιο.
-----------------	---

#### 4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε ασθενείς:

- Με μολυσμένο δέρμα (ακμή ή άλλες λοιμώξεις)
- Υπό Ro-accutane (θεραπεία ακμής από το στόμα)
- Που χρησιμοποιούν τοπικά κρέμα βιταμίνης Α: θα πρέπει να σταματήσουν τη θεραπεία με κρέμα βιταμίνης Α, 3 ημέρες πριν τη θεραπεία και 3 ημέρες μετά.
- Με πρόσφατο ιστορικό καρκίνου
- Με διαβήτη εξαρτώμενο από ινσουλίνη

#### 5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

- Αντισηπτικό διάλυμα για τοπική χρήση και χωρίς αλκοόλ
- Υλικά μίας χρήσης για τη διαδικασία:
  - Βελόνες έγχυσης 4mm x 33G (βελόνες μεσοθεραπείας)
  - Αποστειρωμένες γάζες και γάντια
  - Σύριγγες των 3ml ή των 5ml

#### 6. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

<b>ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ</b>	1 φιαλίδιο των 5ml για το πρόσωπο & το λαιμό. Χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο φιαλίδιο για την περιοχή του ντεκολτέ.
<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε το δέρμα με το αντισηπτικό διάλυμα.</li> <li>- Εφαρμόστε το προϊόν Pluryal mesoline ANTI OX εκτελώντας μια σειρά από πολλαπλούς νυγμούς (nappage) ή με την τεχνική των μικροενέσεων (multi- pricking punctures) σε όλο το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Οι εγχύσεις πρέπει να απέχουν κατά 0,5 εκατοστό, ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τσιμπήματα στο πρόσωπο.</li> <li>- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τεχνική των μικροπομφών (micro papular).</li> <li>- Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συσκευές Microneedling. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόστε το προϊόν τοπικά στο δέρμα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το Roller.</li> </ul>
<b>ΒΑΘΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ</b>	2 – 3 χιλιοστά
	- <b>Αρχική Φάση:</b> 1 συνεδρία / εβδομάδα για 5 συνεχείς εβδομάδες.

<b>ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ</b>	- <b>Φάση Συντήρησης:</b> Πραγματοποιήστε μία συνεδρία συντήρησης κάθε 6 εβδομάδες.
<b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ</b>	Εφαρμόστε τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας Pluryal για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πρωί: Χρησιμοποιήστε το γαλάκτωμα ή την κρέμα DAY MUST</li> <li>- Βράδυ: Χρησιμοποιήστε το serum MOON MUST</li> <li>- Αντιηλιακή προστασία / Τέλεια επιδερμίδα: Χρησιμοποιήστε το BB MUST EMBELLISH (διαθέσιμο σε Light ή Tanned) σε καθημερινή βάση για να αποφευχθεί η φωτογήρανση.</li> </ul>

## 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

<b>ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ</b>	1 με 2 φιαλίδια των 5ml για όλο το τριχωτό της κεφαλής
<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ξεχωρίστε τα μαλλιά σε σειρές και ξεκινήστε τις ενέσεις στο όριο με το μέτωπο.</li> <li>- Εκτελέστε μια σειρά από πολλαπλούς νυγμούς (nappage) ή με την τεχνική των μικροενέσεων (multi- pricking punctures) σε κάθε σειρά</li> <li>- Οι εγχύσεις πρέπει να απέχουν κατά 1-1,5εκ.</li> <li>- Εγχύστε με κλίση της σύριγγας σας 45° σε σχέση με την υπό θεραπεία περιοχή.</li> <li>- Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συσκευές Microneedling. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόστε το προϊόν στο τριχωτό της κεφαλής και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το Roller.</li> </ul>
<b>ΒΑΘΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ</b>	2-3 χιλιοστά
<b>ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Αρχική Φάση:</b> Πραγματοποιήστε μία συνεδρία την εβδομάδα για 6 συνεχείς εβδομάδες.</li> <li>- <b>Φάση Συντήρησης:</b> Πραγματοποιήστε 1 έως 3 συνεδρίες κάθε 8 εβδομάδες.</li> </ul>
<b>ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιορίστε τις θεραπείες περιποίησης μαλλιών (βάψιμο, επαγγελματικό ίσιωμα, επαγγελματικό curling κλπ.) που μπορεί να αποδυναμώσουν τα μαλλιά.</li> <li>- Η λήψη από του στόματος των βιταμινών Β (πανθενόλη και βιοτίνη) μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Η θεραπεία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες για να προσφέρει πλήρη αποτελεσματικότητα.</li> </ul>

## 9. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Pluryal mesoline ANTIOX είναι ένα πολύ ασφαλές προϊόν που αποτελείται από τα πλέον ασφαλή συστατικά και διατίθεται σε αποστειρωμένα φιαλίδια. Ωστόσο, εξαιτίας των ίδιων των "εγχύσεων" ή των συσκευών microneedling, μερικές προσωρινές και ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιθανό

να εμφανιστούν μετά από κάθε θεραπεία και περιλαμβάνουν ερυθρότητα, πόνο ή μώλωπες στο σημείο της έγχυσης ενώ **συνήθως υποχωρούν αυτόματα εντός 48 έως 72 ωρών**.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις:

- Εφαρμόστε μια καταπραϋντική κρέμα με ηρεμιστικό αποτέλεσμα και χωρίς άρωμα, μετά από τη θεραπεία, για μερικές ημέρες.
- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που ακολουθούν τη θεραπεία και χρησιμοποιήστε καθημερινά κρέμα ηλιοπροστασίας (SPF 50+).

## **10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ**

Μετά από μια θεραπεία με Pluryal mesoline ANTIOX, συνιστάται να περιμένετε 1 εβδομάδα πριν κάνετε άλλες θεραπείες που είναι συμβατές με τη μεσοθεραπεία όπως:

- Μικροδερμοαπόξεση
- Ραδιοσυχνότητα
- Ηλεκτροδιέγερση
- Αποτρίχωση με λέιζερ
- Δερματικά πληρωτικά
- Ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης
- Χημικά peelings
- Καρβοξυθεραπεία

Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τη θεραπεία συνταγογραφώντας στον ασθενή συμπληρώματα διατροφής που αποτελούνται από βιταμίνες του συμπλέγματος (B), αντιοξειδωτικά και αμινοξέα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις.