

Pluryal mesoline REFRESH

1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 φιαλίδια των 5ml

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	Θεραπεία του γηρασμένου δέρματος: ρυτίδες, έλλειψη ελαστικότητας, έλλειψη τόνου, έναρξη χαλάρωσης και έλλειψη ενυδάτωσης
ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ	Γυναίκες και άντρες από την ηλικία των 30 ετών, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν ακόμα σημάδια γήρανσης
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ + ράχη των χεριών.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	<ul style="list-style-type: none">- Υαλουρονικό οξύ 40 mg- Vegetal stem cells booster- Βιταμίνες και DNA

3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none">- Απολυμάνετε σχολαστικά την υπό θεραπεία περιοχή με χλωρεξιδίνη.- Συνταγογραφήστε αντική θεραπεία σε περιπτώσεις κινδύνου έρπητα.-Μην εφαρμόζετε σε ασθενείς που πάσχουν από έρπητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.- Απαγορεύστε την ασπιρίνη ή άλλα αντιπηκτικά τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη συνεδρία.- Είναι δυνατή η τοπική αναισθησία με μια τοπική αναισθητική κρέμα. Μπορείτε επιπρόσθετα να προσθέσετε 0,2 ml λιδοκαΐνης στο φιαλίδιο του Pluryal mesoline REFRESH.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none">- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 72 ώρες μετά τη θεραπεία.- Στη συνέχεια, η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη (καθημερινά) και μια αντιηλιακή κρέμα με δείκτη προστασίας SPF 50+ θα πρέπει να εφαρμόζεται καθημερινά και να επαναλαμβάνεται κάθε 2 ώρες σε περίπτωση έντονης έκθεσης στον ήλιο.

4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε ασθενείς:

- Με μολυσμένο δέρμα (ακμή ή άλλες λοιμώξεις)
- Υπό Ro-accutane (θεραπεία ακμής από το στόμα)
- Που χρησιμοποιούν τοπικά κρέμα βιταμίνης Α: θα πρέπει να σταματήσουν τη θεραπεία με κρέμα βιταμίνης Α, 3 ημέρες πριν τη θεραπεία και 3 ημέρες μετά.
- Με πρόσφατο ιστορικό καρκίνου
- Με διαβήτη εξαρτώμενο από ινσουλίνη

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

- Αντισηπτικό διάλυμα για τοπική χρήση και χωρίς αλκοόλ
- Υλικά μίας χρήσης για τη διαδικασία:
 - ο Βελόνες έγχυσης 4mm x 33G (βελόνες μεσοθεραπείας)
 - ο Αποστειρωμένες γάζες και γάντια
 - ο Σύριγγες των 3ml ή των 5ml

6. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΑΜΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	1 φιαλίδιο των 5ml για το πρόσωπο και το λαιμό. Χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο φιαλίδιο για την περιοχή του ντεκολτέ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	<ul style="list-style-type: none">- Καθαρίστε το δέρμα με το αντισηπτικό διάλυμα.- Εφαρμόστε το προϊόν Pluryal mesoline REFRESH εκτελώντας μια σειρά από πολλαπλούς νυγμούς (nappage) ή με την τεχνική των μικροενέσεων (multi- pricking punctures) σε όλο το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Οι εγχύσεις πρέπει να απέχουν κατά 0,5 εκατοστά, ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τσιμπήματα στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ.- Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συσκευές Microneedling. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόστε το προϊόν τοπικά στο δέρμα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το Roller.
ΒΑΘΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	2 χιλιοστά –αυτή η θεραπεία πρέπει να είναι πολύ επιφανειακή καθώς ο σκοπός της είναι να δώσει μια λάμψη στο πρόσωπο και ένα αποτέλεσμα αναζωογόνησης.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ	<ul style="list-style-type: none">- Αρχική Φάση: 1 συνεδρία / εβδομάδα για 5 συνεχείς εβδομάδες.- Φάση Συντήρησης: Πραγματοποιήστε μία συνεδρία συντήρησης κάθε 6 εβδομάδες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Εφαρμόστε τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας Pluryal για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα: <ul style="list-style-type: none">• Πρωί: Χρησιμοποιήστε το γαλάκτωμα ή την κρέμα DAY MUST• Βράδυ: Χρησιμοποιήστε το serum MOON MUST• Αντιηλιακή προστασία / Τέλεια επιδερμίδα: Χρησιμοποιήστε το BB MUST EMBELLISH (διαθέσιμο σε Light ή Tanned) σε καθημερινή βάση για να αποφευχθεί η φωτογήρανση.

7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	1 φιαλίδιο των 5ml για το πρόσωπο και το λαιμό. Χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο φιαλίδιο για την περιοχή του ντεκολτέ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ: Χρησιμοποιήστε την τεχνική των μικροπομφών, τοποθετώντας μικρούς πομφούς κάτω από το δέρμα, σε όλες τις γραμμές του λαιμού και του ντεκολτέ.
ΒΑΘΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	2-3 χιλιοστά
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ	- Αρχική Φάση: 1 συνεδρία / εβδομάδα για 5 συνεχείς εβδομάδες. - Φάση Συντήρησης: Πραγματοποιήστε μία συνεδρία συντήρησης κάθε 6 εβδομάδες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Εφαρμόστε τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας Pluryal για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα: <ul style="list-style-type: none">• Πρωί: Χρησιμοποιήστε το γαλάκτωμα ή την κρέμα DAY MUST• Βράδυ: Χρησιμοποιήστε το serum MOON MUST Αντιηλιακή προστασία / Τέλεια επιδερμίδα: Χρησιμοποιήστε το BB MUST EMBELLISH (διαθέσιμο σε Light ή Tanned) σε καθημερινή βάση για να αποφευχθεί η φωτογήρανση.

8. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	1 φιαλίδιο των 5ml και για τα 2 χέρια. Σε ειδικές περιπτώσεις, χρησιμοποιείτε 1 φιαλίδιο για κάθε χέρι.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Πραγματοποιήστε μια σειρά από πολλαπλούς νυγμούς (nappage) ή με την τεχνική των μικροενέσεων (multi- pricking punctures) στη ράχη των χεριών και τα δάχτυλα, διατηρώντας μια απόσταση μεταξύ των εγχύσεων από 0,5 έως 0,7 εκατοστά.
ΒΑΘΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	2 χιλιοστά
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ	- Αρχική Φάση: 1 συνεδρία / εβδομάδα για 5 συνεχείς εβδομάδες. - Φάση Συντήρησης: Πραγματοποιήστε μία συνεδρία συντήρησης κάθε 6 εβδομάδες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Χρησιμοποιήστε μία κατάλληλη ενυδατική κρέμα χεριών σε καθημερινή βάση και μία αντιηλιακή κρέμα σε καθημερινή βάση για την πρόληψη της εμφάνισης σκούρων κηλίδων.

9. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Pluryal mesoline REFRESH είναι ένα πολύ ασφαλές προϊόν που αποτελείται από τα πλέον ασφαλή συστατικά και διατίθεται σε αποστειρωμένα φιαλίδια. Ωστόσο, εξαιτίας των ίδιων των "εγχύσεων" ή των συσκευών microneedling, μερικές προσωρινές και ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά από κάθε θεραπεία και περιλαμβάνουν ερυθρότητα, πόνο ή μώλωπες στο σημείο της έγχυσης ενώ **συνήθως υποχωρούν αυτόματα εντός 48 έως 72 ωρών**.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις:

- Εφαρμόστε μια καταπραϋντική κρέμα με ηρεμιστικό αποτέλεσμα και χωρίς άρωμα, μετά από τη θεραπεία, για μερικές ημέρες.
- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που ακολουθούν τη θεραπεία και χρησιμοποιήστε καθημερινά κρέμα ηλιοπροστασίας (SPF 50+).

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Μετά από μια θεραπεία με Pluryal mesoline REFRESH, συνιστάται να περιμένετε 1 εβδομάδα πριν κάνετε άλλες θεραπείες που είναι συμβατές με τη μεσοθεραπεία όπως:

- Μικροδερμοαπόξεση
- Ραδιοσυχνότητα
- Ηλεκτροδιέγερση
- Αποτρίχωση με λέιζερ
- Δερματικά πληρωτικά
- Ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης
- Χημικά peelings
- Καρβοξυθεραπεία