

Pluryal mesoline SHINE

1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 φιαλίδια των 5ml

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ενδείξεις	Θεραπεία των κηλίδων υπερμελάγχρωσης λόγω ορμονικών αλλαγών κυρίως κατά την εμμηνόπαυση.
Προφίλ Ασθενών	<ul style="list-style-type: none">- Άτομα όλων των τύπων δέρματος με προβλήματα υπερμελάγχρωσης (Καυκάσιοι, Μεσογειακοί, Ασιάτες, Νοτιοαμερικάνοι και Αφρικανοί).- Γυναίκες στην εμμηνόπαυση.- Γήρανση του δέρματος σε άντρες και γυναίκες (οι γεροντικές κηλίδες εμφανίζονται στο πρόσωπο, το ντεκολτέ και τη ράχη των χεριών).- Άτομα με μεταφλεγμονώδη υπερχρωματισμό (λόγω ακμής, αποτρίχωσης, εγκαύματος, ουλής, δερματικών παθήσεων κλπ).
Περιοχές Εφαρμογής	Πρόσωπο, ντεκολτέ και ράχη χεριών κυρίως καθώς και κάθε άλλη προσβεβλημένη περιοχή του σώματος.
Σύνθεση	Ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), κοζικό οξύ, πυροσταφυλικό οξύ, φυτικό οξύ και εκχυλίσματα φύλλων μουριάς (morus alba).

3. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none">- Απολυμάνετε σχολαστικά την υπό θεραπεία περιοχή.- Συνταγογραφήστε αντιική θεραπεία σε περιπτώσεις κινδύνου έρπητα.-Μην εφαρμόζετε σε ασθενείς που πάσχουν από έρπητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.- Απαγορέψτε την ασπιρίνη ή άλλα αντιπηκτικά τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη συνεδρία.- Είναι δυνατή η τοπική αναισθησία με μια τοπική αναισθητική κρέμα. Μπορείτε επιπρόσθετα να προσθέσετε 0,2 ml λιδοκαΐνης στο φιαλίδιο του Pluryal mesoline SHINE.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 72 ώρες μετά τη θεραπεία. Στη συνέχεια, η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη (σε καθημερινή βάση) και μια αντιηλιακή κρέμα με δείκτη προστασίας SPF 50+ θα πρέπει να εφαρμόζεται καθημερινά και να επαναλαμβάνεται κάθε 2 ώρες σε περίπτωση έντονης έκθεσης στον ήλιο.

4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε ασθενείς:

- Με μολυσμένο δέρμα (ακμή ή άλλες λοιμώξεις)
- Υπό Ro-accutane (θεραπεία ακμής από το στόμα)
- Που χρησιμοποιούν τοπικά κρέμα βιταμίνης A: θα πρέπει να σταματήσουν τη θεραπεία με κρέμα βιταμίνης A, 3 ημέρες πριν τη θεραπεία και 3 ημέρες μετά.
- Με πρόσφατο ιστορικό καρκίνου
- Με διαβήτη εξαρτώμενο από ινσουλίνη

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

- Αντισηπτικό διάλυμα για τοπική χρήση και χωρίς αλκοόλ
- Υλικά μίας χρήσης για τη διαδικασία:
 - ο Βελόνες έγχυσης 4mm x 33G (βελόνες μεσοθεραπείας)
 - ο Αποστειρωμένες γάζες και γάντια
 - ο Σύριγγες των 3ml ή των 5ml

6. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δοσολογία	1 φιαλίδιο των 5ml για το πρόσωπο.
Τεχνική Εφαρμογής	<ul style="list-style-type: none">- Καθαρίστε το δέρμα με το αντισηπτικό διάλυμα.- Εφαρμόστε ένα ελαφρύ peeling (όπως γλυκολικό οξύ 25% ή 35% ή γαλακτικό οξύ) για λίγα λεπτά. Εξουδετερώστε το ή ξεπλύνετε το, σύμφωνα με τις οδηγίες του.- Εφαρμόστε το προϊόν Pluryal mesoline SHINE εκτελώντας μια σειρά από πολλαπλούς νυγμούς (nappage) ή με την τεχνική των μικροενέσεων (multi-pricking punctures) σε όλο το πρόσωπο, επιμένοντας στις χρωστικές κηλίδες. Οι εγχύσεις πρέπει να απέχουν κατά 0,5 εκατοστό, ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τσιμπήματα στο πρόσωπο.
Βάθος Έγχυσης	1-2 χιλιοστά – καθώς αυτή η θεραπεία θα πρέπει να είναι επιφανειακή αφού τα μελανοκύτταρα είναι επιφανειακά τοποθετημένα.
Επαναληψιμότητα	<ul style="list-style-type: none">- Αρχική Φάση: 1 συνεδρία / εβδομάδα για 6-8 συνεχείς εβδομάδες.- Φάση Συντήρησης: Πραγματοποιήστε μία συνεδρία συντήρησης κάθε 4 εβδομάδες.
Οδηγίες για το σπίτι	Χρησιμοποιήστε μια λευκαντική κρέμα στο σπίτι (χωρίς υδροκινόνη) κάθε βράδυ μετά από έναν βαθύ καθαρισμό του προσώπου. Προστασία από τον ήλιο/Τέλεια επιδερμίδα: Χρησιμοποιήστε το BB MUST EMBELLISH (διαθέσιμο σε Light ή Tanned) σε καθημερινή βάση για πρόληψη της φωτογήρανσης.

7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΝΤΕΚΟΛΤΕ

Δοσολογία	1 φιαλίδιο των 5ml ανά περιοχή. Εάν η περιοχή εφαρμογής είναι μεγάλη, χρησιμοποιήστε 2 φιαλίδια σε κάθε συνεδρία.
Τεχνική Εφαρμογής	<ul style="list-style-type: none">- Καθαρίστε το δέρμα με το αντισηπτικό διάλυμα.- Εφαρμόστε ένα ελαφρύ peeling (όπως γλυκολικό οξύ 25% ή 35%) για λίγα λεπτά. Εξουδετερώστε το ή ξεπλύνετε το, σύμφωνα με τις οδηγίες του.- Εφαρμόστε το προϊόν Pluryal mesoline SHINE εκτελώντας μια σειρά από πολλαπλούς νυγμούς (nappage) ή με την τεχνική των μικροενέσεων (multi-pricking punctures) σε όλο το ντεκολτέ, επιμένοντας στις χρωστικές κηλίδες. Οι εγχύσεις πρέπει να απέχουν κατά 0,5 εκατοστό, ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τσιμπήματα στην υπό θεραπεία περιοχή.
Βάθος Έγχυσης	1-2 χιλιοστά – καθώς αυτή η θεραπεία θα πρέπει να είναι επιφανειακή αφού τα μελανοκύτταρα είναι επιφανειακά τοποθετημένα.

Επαναληψιμότητα	<ul style="list-style-type: none"> - Αρχική Φάση: Πραγματοποιήστε 1 συνεδρία / εβδομάδα για 6-8 συνεχείς εβδομάδες. - Φάση Συντήρησης: Πραγματοποιήστε μία συνεδρία συντήρησης κάθε 4 εβδομάδες.
Οδηγίες για το σπίτι	<p>Χρησιμοποιήστε μια λευκαντική κρέμα στο σπίτι (χωρίς υδροκινόνη) κάθε βράδυ μετά από έναν βαθύ καθαρισμό του προσώπου.</p> <p>Προστασία από τον ήλιο/Τέλεια επιδερμίδα: Χρησιμοποιήστε το BB MUST EMBELLISH (διαθέσιμο σε Light ή Tanned) σε καθημερινή βάση για πρόληψη της φωτογήρανσης.</p>

8. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΚΗΛΙΔΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΡΑΧΗ ΧΕΡΙΩΝ)

Δοσολογία	1 φιαλίδιο των 5ml και για τα δύο χέρια.
Τεχνική Εφαρμογής	<ul style="list-style-type: none"> - Καθαρίστε το δέρμα με το αντισηπτικό διάλυμα. - Εφαρμόστε ένα ελαφρύ peeling (όπως γλυκολικό οξύ 25% ή 35%) για λίγα λεπτά. Εξουδετερώστε το ή ξεπλύνετε το, σύμφωνα με τις οδηγίες του. - Εφαρμόστε το προϊόν Pluryal mesoline SHINE εκτελώντας μια σειρά από πολλαπλούς συγμούς (nappage) ή με την τεχνική των μικροενέσεων (multi-pricking punctures) σε όλη την περιοχή της ράχης των χεριών και στα δάχτυλα, επιμένοντας στις χρωστικές κηλίδες. Οι εγχύσεις πρέπει να απέχουν κατά 0,5 εκατοστό, ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τσιμπήματα στην υπό θεραπεία περιοχή.
Βάθος Έγχυσης	1-2 χιλιοστά – καθώς αυτή η θεραπεία θα πρέπει να είναι επιφανειακή αφού τα μελανοκύτταρα είναι επιφανειακά τοποθετημένα.
Επαναληψιμότητα	<ul style="list-style-type: none"> - Αρχική Φάση: Πραγματοποιήστε 1 συνεδρία / εβδομάδα για 6-8 συνεχείς εβδομάδες. - Φάση Συντήρησης: Πραγματοποιήστε μία συνεδρία συντήρησης κάθε 4 εβδομάδες.
Οδηγίες για το σπίτι	<p>Χρησιμοποιήστε μια λευκαντική κρέμα στο σπίτι (χωρίς υδροκινόνη) κάθε βράδυ μετά από έναν βαθύ καθαρισμό του προσώπου.</p> <p>Προστασία από τον ήλιο/Τέλεια επιδερμίδα: Χρησιμοποιήστε το BB MUST EMBELLISH (διαθέσιμο σε Light ή Tanned) σε καθημερινή βάση για πρόληψη της φωτογήρανσης.</p>

9. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Pluryal mesoline SHINE είναι ένα πολύ ασφαλές προϊόν που αποτελείται από τα πλέον ασφαλή συστατικά και διατίθεται σε αποστειρωμένα φιαλίδια. Ωστόσο, εξαιτίας των ίδιων των "εγχύσεων" ή των συσκευών microneedling, μερικές προσωρινές και ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά από κάθε θεραπεία και περιλαμβάνουν ερυθρότητα, πόνο ή μώλωπες στο σημείο της έγχυσης ενώ **συνήθως υποχωρούν αυτόματα εντός 48 έως 72 ωρών.**

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις:

- Εφαρμόστε μια καταπραϋντική κρέμα με ηρεμιστικό αποτέλεσμα και χωρίς άρωμα, μετά από τη θεραπεία, για μερικές ημέρες.
- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που ακολουθούν τη θεραπεία και

χρησιμοποιήστε καθημερινά κρέμα ηλιοπροστασίας (SPF 50+).

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Μετά από μια θεραπεία με Pluryal mesoline SHINE, συνιστάται να περιμένετε 1 εβδομάδα πριν κάνετε άλλες θεραπείες που είναι συμβατές με τη μεσοθεραπεία όπως:

- Μικροδερμοαπόξεση
- Ραδιοσυχνότητα
- Ηλεκτροδιέγερση
- Αποτρίχωση με λέιζερ
- Δερματικά πληρωτικά
- Ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης
- Καρβοξυθεραπεία