

Pluryal mesoline TIGHT

1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 φιαλίδια των 5ml

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ενδείξεις	Θεραπεία της χαλάρωσης του δέρματος που προκαλείται από τη γήρανση, τις ραγάδες και τις ουλές ακμής.
Προφίλ Ασθενών	Γήρανση του δέρματος σε γυναίκες και άνδρες, άτομα με σημάδια ουλών ακμής και γυναίκες με ραγάδες (μετά την εγκυμοσύνη και λόγω διακυμάνσεων απώλειας βάρους) σε διάφορες περιοχές του σώματος.
Περιοχής Εφαρμογής	Περιοχές προσώπου, λαιμού, ντεκολτέ και σώματος (οι ραγάδες βρίσκονται συνήθως στο στήθος, την κοιλιά, τους μηρούς, τους γοφούς και τους γλουτούς)
Σύνθεση	Διμεθυλαμινοαιθανόλη (DMAE), πανθενόλη (βιταμίνη B5), συνένζυμο Q10 και πυριτίο.

3. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none">- Απολυμάνετε σχολαστικά την υπό θεραπεία περιοχή.- Συνταγογραφήστε αντική θεραπεία σε περιπτώσεις κινδύνου έρπητα.-Μην εφαρμόζετε σε ασθενείς που πάσχουν από έρπητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.- Απαγορέψτε την ασπιρίνη ή άλλα αντιπηκτικά τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη συνεδρία.- Είναι δυνατή η τοπική αναισθησία με μια τοπική αναισθητική κρέμα. Μπορείτε επιπρόσθετα να προσθέσετε 0,2 ml λιδοκαΐνης στο φιαλίδιο του Pluryal mesoline TIGHT.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 72 ώρες μετά τη θεραπεία. Στη συνέχεια, η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη (καθημερινά) και μια αντιηλιακή κρέμα με δείκτη προστασίας SPF 50+ θα πρέπει να εφαρμόζεται καθημερινά και να επαναλαμβάνεται κάθε 2 ώρες σε περίπτωση έντονης έκθεσης στον ήλιο.

4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε ασθενείς:

- Με μολυσμένο δέρμα (ακμή ή άλλες λοιμώξεις)
- Υπό Ro-accutane (θεραπεία ακμής από το στόμα)
- Που χρησιμοποιούν τοπικά κρέμα βιταμίνης A: θα πρέπει να σταματήσουν τη θεραπεία με κρέμα βιταμίνης A, 3 ημέρες πριν τη θεραπεία και 3 ημέρες μετά.
- Με πρόσφατο ιστορικό καρκίνου
- Με διαβήτη εξαρτώμενο από ινσουλίνη

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

- Αντισηπτικό διάλυμα για τοπική χρήση και χωρίς αλκοόλ
- Υλικά μίας χρήσης για τη διαδικασία:
 - o Βελόνες έγχυσης 4mm x 30G (βελόνες μεσοθεραπείας)
 - o Αποστειρωμένες γάζες
 - o Αποστειρωμένα γάντια
 - o Σύριγγες των 3ml ή των 5ml

6. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟ

Δοσολογία	1 φιαλίδιο των 5ml για το πρόσωπο και το λαιμό
Τεχνική Εφαρμογής	<p>Στο Πρόσωπο: Εκτελέστε μια σειρά από πολλαπλούς νυγμούς (nappage) ή με την τεχνική των μικροενέσεων (multi- pricking punctures) σε όλο το πρόσωπο, επιμένοντας στο περίγραμμα του προσώπου όπου η χαλάρωση είναι πιο έντονη. Οι εγχύσεις πρέπει να απέχουν κατά 0,5 εκατοστό, ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τσιμπήματα στο πρόσωπο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συσκευές Microneedling: σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόστε το προϊόν τοπικά στο δέρμα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το Roller.</p> <p>Στο λαιμό: Εκτελέστε μια σειρά εγχύσεων μικροπομφών, τοποθετώντας ένα μικρό πομφό και στη συνέχεια, 1-2 εκατοστά μακριά, έναν άλλο πομφό. Ο πομφός (papula) είναι μια μικρή ποσότητα προϊόντος, σε μία ώση (bolus), ενδοδερμικά και πολύ επιφανειακά, στα 3-4 χιλιοστά. Ακολουθήστε τις γραμμές του λαιμού (necklines) για να εκτελέσετε μια σειρά εγχύσεων με πομφούς.</p>
Βάθος Έγχυσης	3-4 χιλιοστά - για τους πολλαπλούς νυγμούς (nappage) στο πρόσωπο, είναι δυνατό να είναι ελαφρώς πιο επιφανειακή η έγχυση (2 χιλιοστά), αλλά για τις εγχύσεις με πομφούς στο λαιμό, εγχύστε στα 3-4 χιλιοστά.
Επαναληψιμότητα	<ul style="list-style-type: none">- Αρχική Φάση: 1 συνεδρία / εβδομάδα για 5 συνεχείς εβδομάδες.- Φάση Συντήρησης: Πραγματοποιήστε μία συνεδρία συντήρησης κάθε 6 εβδομάδες.
Οδηγίες για το Σπίτι	<p>Εφαρμόστε τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας Pluryal για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα:</p> <ul style="list-style-type: none">- Πρωί: Χρησιμοποιήστε το γαλάκτωμα ή την κρέμα DAY MUST- Βράδυ: Χρησιμοποιήστε το serum MOON MUST <p>Αντιηλιακή προστασία / Τέλεια επιδερμίδα: Χρησιμοποιήστε το BB MUST EMBELLISH (διαθέσιμο σε Light ή Tanned) σε καθημερινή βάση για να αποφευχθεί η φωτογήρανση.</p>

7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΡΑΓΑΔΕΣ

Δοσολογία	1 φιαλίδιο των 5ml για μια περιορισμένη περιοχή. Εάν μια μεγάλη περιοχή είναι υπό θεραπεία, χρησιμοποιήστε 2 φιαλίδια ανά συνεδρία.
Τεχνική Εφαρμογής	<p>Following the stretch mark, perform micro-papular injections by spacing the papules by 1cm – 1.5cm.</p> <p>Κατά μήκος της ραγάδας, πραγματοποιήστε εγχύσεις μικροπομφών διατηρώντας</p>

	μία απόσταση μεταξύ των πομφών στο 1 εκ. -1,5 εκ.
Βάθος Έγχυσης	3- 4 χιλιοστά
Επαναληψιμότητα	Πρόσφατες ή κόκκινες ραγάδες: Εκτελέστε μία συνεδρία κάθε εβδομάδα για 5 συνεχείς εβδομάδες Παλιές ή λευκές ραγάδες: Εκτελέστε μία συνεδρία κάθε εβδομάδα για 8 συνεχόμενες εβδομάδες.
Οδηγίες για το Σπίτι	Χρησιμοποιήστε μια καταπραϊντική κρέμα χωρίς κορτικοστεροειδή

9. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Pluryal mesoline TIGHT είναι ένα πολύ ασφαλές προϊόν που αποτελείται από τα πλέον ασφαλή συστατικά και διατίθεται σε αποστειρωμένα φιαλίδια. Ωστόσο, εξαιτίας των ίδιων των "εγχύσεων" ή των συσκευών microneedling, μερικές προσωρινές και ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά από κάθε θεραπεία και περιλαμβάνουν ερυθρότητα, πόνο ή μώλωπες στο σημείο της έγχυσης ενώ **συνήθως υποχωρούν αυτόματα εντός 48 έως 72 ωρών.**

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις:

- Εφαρμόστε μια καταπραϊντική κρέμα με ηρεμιστικό αποτέλεσμα και χωρίς άρωμα, μετά από τη θεραπεία, για μερικές ημέρες.
- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που ακολουθούν τη θεραπεία και χρησιμοποιήστε καθημερινά κρέμα ηλιοπροστασίας (SPF 50+).

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Μετά από μια θεραπεία με Pluryal mesoline TIGHT, συνιστάται να περιμένετε 1 εβδομάδα πριν κάνετε άλλες θεραπείες που είναι συμβατές με τη μεσοθεραπεία όπως:

- Μικροδερμοαπόξεση
- Ραδιοσυχνότητα
- Ηλεκτροδιέγερση
- Αποτρίχωση με λείζερ
- Δερματικά πληρωτικά
- Ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης
- Χημικά peelings
- Καρβοξυθεραπεία